Guía para personal de bancos de sangre respecto a enfermedad similar a influenza.

Objetivos generales de la guía

Brindar al personal de bancos de sangre recomendaciones las definiciones para identificar los casos de enfermedad similar a influenza, las pautas para abordaje y remisión de estos casos y las medidas de protección del personal.

Para los bancos en sus áreas de selección y asesoría a donantes:

1. Realizar monitoreo permanente a estas áreas de espera para evitar el contacto directo de aquellas personas que presentan síntomas de infección respiratoria con otros donantes.
2. Realizar asesoría a aquellas personas sintomáticas respecto a que no deben realizar la donación y respecto a que en caso de que sus síntomas sean más evidentes acuda al médico.

Recomendaciones al momento de la selección del donante:

Diferir como donantes de sangre a aquellas personas que presentan síntomas de infección respiratoria (malestar, fiebre, tos, etc) con cuadro clínico de máximo de cinco días de evolución **y** que reporta alguno de los siguientes antecedentes:

- Historia de viaje en los 7 días previos a países donde se han confirmado casos de influenza A H1N1 por subtipo nuevo
- Contacto estrecho a un metro o menos de distancia con una persona que presenta Infección Respiratoria Aguda y con antecedente de viaje a países donde se han confirmado casos de influenza A H1N1 por subtipo nuevo

Tiempo de diferimiento: dos semanas después que desaparecen los síntoma

Recomendaciones a realizar a todos los donantes para evitar la transmisión de la infección? (ver material anexo)

Avenida calle 26 No. 51-60 - Conmutador 220 77 00
Apartados 80080 y 80334
Bogotá, D.C., Colombia
ins@ins.gov.co - www.ins.gov.co
Línea gratuita 01 8000 113400

- Lavado de manos frecuente, especialmente después de usar pañuelos de tela o papel
- Evitar saludar de mano y de beso
- Evitar frotarse los ojos
- En lo posible, evitar asistir a sitios de concentración masiva, si no es necesario.

Para personal del banco de sangre:

1. Uso de mascarilla quirúrgica (tapabocas de tela) para el monitoreo en las áreas de selección, asesoría y atención de donantes.

2.. Lavado de manos antes y después de entrar en contacto con todo donantes o con superficies tocadas por estos. **(ver manual de Bioseguridad anexo)**

Se recomienda estar atento a los informes de avance sobre este evento con el fin de evitar programas jornadas de donación en sitios de presencia de casos de **enfermedad similar a influenza**.

Se anexa material de apoyo.

Mayores informes:

www. minproteccionsocial.gov.co.

www. ins.gov.co

Avenida calle 26 No. 51-60 - Conmutador 220 77 00
Apartados 80080 y 80334
Bogotá, D.C., Colombia
ins@ins.gov.co - www.ins.gov.co
Línea gratuita 01 8000 113400