



Figura 3. Distribución espacial de la tasa ajustada promedio de mortalidad por tuberculosis en Colombia, 2010-2024



Departamento	Tasa	Nivel
Vaupés	8,47	Alto
Amazonas	7,59	Alto
La Guajira	4,86	Alto
Caquetá	4,31	Alto
Guaviare	4,19	Alto
Guainía	3,75	Alto
Atlántico	3,57	Alto
Meta	3,52	Alto
Arauca	3,51	Alto
Risaralda	3,28	Alto
Chocó	3,22	Alto
Casanare	3,19	Medio
Vichada	2,93	Medio
Valle del Cauca	2,88	Medio
Cesar	2,80	Medio
Norte de Santander	2,57	Medio
Quindío	2,55	Medio
Antioquia	2,50	Medio
Tolima	2,47	Medio
Huila	2,46	Medio
Santander	2,33	Medio
Magdalena	2,03	Medio
Putumayo	1,97	Bajo
Caldas	1,94	Bajo
San Andrés	1,87	Bajo
Bolívar	1,72	Bajo
Cauca	1,60	Bajo
Córdoba	1,41	Bajo
Cundinamarca	1,37	Bajo
Bogotá, D.C.	1,14	Bajo
Nariño	0,97	Bajo
Boyacá	0,90	Bajo
Sucre	0,71	Bajo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos públicos del DANE