

No. Casos


1575



Se incluyen los casos de leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral

Incidencia de leishmaniasis 2020 – 2025*

Incidencia de leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucosa, Colombia 2020 – 2025p




Casos de leishmaniasis, Colombia, 2020 a PE IV 2025p


año	L. cutánea	L. mucosa	L. visceral
2020	6109	59	8
2021	6118	83	7
2022	5649	93	13
2023	4830	91	6
2024	5116	93	6
2025	1556	18	1

* Período epidemiológico IV 2025. Datos preliminares.
Denominador de incidencia: proyecciones población en riesgo para el evento. MSPS.

Municipios con leishmaniasis cutánea en menores de 10 años PE IV 2025p



Comportamiento inusual de notificación Leishmaniasis cutánea PE IV 2025p



Variables sociodemográficas de interés leishmaniasis cutánea a PE IV, 2024 – 2025p

Comportamiento frente a 2024: ● Aumento ● Sin cambio ● Disminución

 Hombres	Sexo			
	2024		Situación	p
	2025p	72,4 %	Sin cambio	0,43

 Rural*	Área de ocurrencia			
	2024		Situación	p
	2025p	80,9 %	Sin cambio	0,18

 20 a 29 años	Grupo de edad			
	2024		Situación	p
	2025p	32,0 %	Aumento	<0,01

 Subsidiado	Afiliación al SGSSS			
	2024		Situación	p
	2025p	60,8 %	Disminución	<0,01

* Incluye centro poblado y rural disperso

No. Casos

1575

Se incluyen los casos de leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral



*Indicadores leishmaniasis cutánea PE IV – 2025p

Entidad territorial de procedencia	Casos L. cutánea	Casos L. cutánea menores de 10 años	Incidencia de L. cutánea por 100.000 habitantes en riesgo	Incidencia de L. cutánea en menores de 10 años por 100.000 habitantes en riesgo
Amazonas	3	0	13,92	0,00
Antioquia	331	20	30,74	1,86
Arauca	8	1	7,63	0,95
Atlántico	1	0	110,62	0,00
Barranquilla	0	0	0,00	0,00
Bolívar	128	7	34,58	1,89
Boyacá	80	13	93,33	15,17
Buenaventura	3	0	4,15	0,00
Caldas	64	13	50,65	10,29
Cali	0	0	0,00	0,00
Caquetá	65	2	44,77	1,38
Cartagena	0	0	0,00	0,00
Casanare	0	0	0,00	0,00
Cauca	27	2	3,98	0,29
Cesar	95	10	40,19	4,23
Chocó	66	6	21,34	1,94
Córdoba	47	0	5,61	0,00
Cundinamarca	39	2	13,26	0,68
Guainía	6	0	51,94	0,00
La Guajira	5	2	2,25	0,90
Guaviare	36	0	90,18	0,00
Huila	1	0	0,16	0,00
Magdalena	0	0	0,00	0,00
Meta	28	1	10,92	0,39
Nariño	61	3	12,56	0,62
Norte de Santander	46	1	14,60	0,32
Putumayo	62	1	37,12	0,60
Quindío	0	0	0,00	0,00
Risaralda	54	20	31,17	11,54
Santa Marta	1	0	1,71	0,00
Santander	194	34	47,12	8,26
Sucre	25	0	7,78	0,00
Tolima	52	7	14,90	2,01
Valle del Cauca	2	0	0,50	0,00
Vaupés	2	0	6,78	0,00
Vichada	6	0	6,88	0,00
Colombia*	1538	145	15,70	1,48


* Se excluyen los casos procedentes del exterior

Poblaciones especiales leishmaniasis cutánea PE IV – 2025p


Comportamiento frente a 2024: ● Aumento ● Sin cambio ● Disminución

 Militares			
2024	16,7 %	Situación	p
2025p	21,8 %	Aumento	<0,01
 Agricultores			
2024	18,5 %	Situación	p
2025p	15,4 %	Disminución	0,01
 Mineros			
2024	4,2 %	Situación	p
2025p	4,2 %	Sin cambio	0,48
 Indígenas			
2024	5,5 %	Situación	p
2025p	6,0 %	Sin cambio	0,27
 Afrocolombianos			
2024	3,3 %	Situación	p
2025p	5,3 %	Aumento	<0,01

Departamentos* con casos leishmaniasis mucosa PE IV 2025p



Variables sociodemográficas * de interés leishmaniasis mucosa PE IV – 2025p



* Se excluyen los casos de militares

No. Casos

1575



Se incluyen los casos de leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral

leishmaniasis visceral PE IV – 2025p



Ovejas (Sucre)

Hombre 5 años
Afiliación al SGSSS: Subsidiado
Confirmado IFI
Letalidad 0 %



*Indicadores leishmaniasis PE IV– 2025p

Incidencia nacional acumulada

Leishmaniasis cutánea 15,70 (1538 casos / 9 795 512 habitantes en riesgo) * 100 000
Leishmaniasis mucosa 0,18 (18 casos / 9 795 512 habitantes en riesgo) * 100 000

Incidencia nacional acumulada leishmaniasis cutánea en población general (sin militares)

12,24 (1199 casos / 9 795 512 habitantes en riesgo) * 100 000

Incidencia nacional acumulada en menores de 10 años

1,48 (145 casos / 9 795 512 habitantes en riesgo) * 100 000

* Se excluyen los casos procedentes del exterior

Ficha técnica

Con base en la información reportada al Sivigila de los eventos Leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral, con corte hasta la semana epidemiológica 16 de 2025, se realizó la estimación de la distribución porcentual de algunas variables demográficas. Para el análisis de los comportamientos inusuales se utilizó como modelo de probabilidad la distribución de Poisson, que permite determinar cuáles son las entidades territoriales con aumento o disminución de casos, con significación estadística; para este cálculo se incluyó la notificación de cada entidad territorial por semana epidemiológica desde el año 2020 al 2024 y lo observado en 2025. Asimismo, se calculó la incidencia por entidad territorial de procedencia.

Se realizó control de calidad de la información. En el comportamiento del evento se tienen en cuenta los casos notificados al Sivigila, por entidad territorial de procedencia. El denominador de los indicadores se tomó de la proyección de población en riesgo (del Ministerio de Salud y Protección Social) actualizada 2023.

Luis Enrique Mayorga Mogollón
Correo electrónico: lmayorga@ins.gov.co
Grupo de vigilancia y control de enfermedades transmisibles endoepidémicas y relacionadas con salud sexual.
Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

Instituto Nacional de Salud
Correo electrónico: contactenos@ins.gov.co
Teléfono: +57(601) 220 7700 Ext.1627
Bogotá, Colombia
www.ins.gov.co